

# โรคพิษสุนัขบ้า

เกิดจากเชื้อ: รูปร่างคล้ายกระสุนปืน ถูกทำลายได้ง่าย เมื่อถูกความร้อน ความแห้ง แสงแดด ยาฆ่าเชื้อ:

คลอรีน แอลกอฮอล์ กรด หรือ ด่าง อย่างแรง เกิดในสัตว์เลือดอุ่น เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว เ ลิง ชะนี กระรอก กระแต เสือ หมู ค่างดาว รวมทั้งคน แต่ในประเทศไทยพบมา (96% ของจำนวนที่พบเชื้อ ห้องปฏิบัติการ) รองลงมา คือ แมว



**การติดต่อ** โดยกกัดสัตว์ที่เป็นโรค กัด ช่วน เลีเ น้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือท บาดแผล

**ระยะฟักตัวในสุนัข** 7 วัน ถึง 6 เดือน ขึ้น บริเวณที่ได้รับเชื้อ ความรุนแรงของเชื้อ ประมาณ 2-6 สัปดาห์

**อาการในสุนัข** มี 2 ชนิด คือ ชนิดซึม และ ชนิดดุ ร้าย



## จะทำอย่างไรเมื่อถูกสัตว์กัด



**1. ล้างแผล**  
ล้างแผลด้วยสบู่ หลาย ๆ ครั้ง เพื่อล้างเชื้อ ออกจากบาดแผลถ้ามีเลือด

ออกควรปล่อยให้เลือดไหลออก อย่าบีบหรือเดิน แผล เพราะจะทำให้เชื้อแพร่กระจายไป



**2. ใส่ยา**  
ใส่ยาใส่แผล เช่น เบตา ดิน ทิงเจอร์ไอโอดีน แอลกอฮอล์ 70 %

จะช่วยฆ่าเชื้อ อย่าใส่สิ่งอื่น เช่น เกลือ ยาฉุน ลง ในแผล ไม่ควรเย็บแผล ถ้าจำเป็นควรรอไว้ 3-4 วัน ถ้าเลือดออกมากหรือแผลใหญ่อาจเย็บหลวม ๆ และใส่ท่อระบายไว้



**3. กักหมา**  
กักสัตว์ที่กัดไว้ด อย่างน้อย 15 วัน โดยให้น้ำ และอาหารตามปกติ

อย่าฆ่าสัตว์ให้ตายทันที เว้นแต่สัตว์เ ดูร้ายกัดคนหรือ สัตว์อื่นหรือไม่สามารถกักสัตว์: ถ้าสัตว์หนีหายไป ให้ถือว่าสัตว์นั้นเป็นโรคพิษสุ



**4. หาทหมอ**  
รีบไปหาแพทย์หรือสัตวแพทย์ทันที เพื่อขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการฉีดวัค อยารอกจนสัตว์

ที่กัด เมื่อสัตว์ตายรีบตัดหัวส่ง สุนัขบ้า

## จะส่งซากสัตว์วินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไร

เมื่อสงสัยว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ควรกักขั ปลอดกัย และเฝ้าดูอาการประมาณ 15 วัน ไม่ควร ทำลายสัตว์โดยไม่จำเป็น ควรปล่อยให้สัตว์ตายเอง ซึ่ง ตรวจพบเชื้อได้ง่าย แะ ในการส่งซากควรส่งให้ เร็วที่สุดโดยปฏิบัติอย่า เรื่องความสะอาด ระลึกไว้เสมอว่า สัตว์อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ จึงควร สวมถุงมือขณะเก็บซาก และล้างมือให้สะอาดหลังจากเก็บ ซาก ควรส่งเฉพาะส่วนหัว



### 1. ตัดหัวสัตว์

ตัดหัวสัตว์ตรงคอต่อ ใส่ถุงพลาสติกซ้อน หลาย ๆ ชั้น รัดปากถุงให้แน่น ใส่ถุงมี ทุกครั้งที่ตัด! ถ้าเป็นแมวหรือสัตว์ ตัวเล็กสามารถส่งไป



### 2. แช่แข็ง

ใส่กระติกหรือภาชนะ เช่น กล่องโฟม แล้วใส่น้ำแข็งให้เย็น ตลอดเวลา แล้วใส่น้ำแข็งให้เย็น ตลอดเวลา



### 3. ประวัตติ

ส่งพร้อมประวัติสัตว์ ชนิด เพศ อายุ สี อาการป่วย ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์พ เจ้าของสัตว์ และผู้ถูกกัด

ในกรณีส่งซากควรส่ง ภายใน 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์ จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ

ควรไปพบสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนเมื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสัตว์ เช่น ชนิดสัตว์ สี เพศ พันธุ์ อายุ สถานที่ถูกกัด เพื่อบริการทางการแพทย์ป้องกันและควบคุมโรคทั่วไป

# จะป้องกันสุนัขขี้ได้ยังไง



## 1. ไม่ปล่อยสุนัขพ่นผ่าน

สุนัขจรจัดที่อยู่ข้างถนนเป็นตัวแพร่เชื้อโรคที่สำคัญ อาจกัดผ่านไปมาหรือกัดสุนัขอื่นที่

โรคพิษสุนัขขี้ได้

## 2. ฉีดวัคซีนป้องกันทุกปีสุนัข

จรเป็นหน้าที่ของเจ้าของ (ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขขี้ 2535) ที่จะต่อ

สุนัขอายุระหว่าง 2-4 เดือน ได้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขขี้ และฉีดซ้ำตามที่สั

## 3. อย่าให้มีลูกมากโดยการทำ

หมันสุนัขทั้งตัวผู้และตัวเมีย หรือฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขตัวเมีย ไม่ให้มีลูกมากเกินไปจนไม่อาจเลี้ยงดูได้ต้องนำไป

กลายเป็นสุนัขจรจัดและเป็นปัญหาของสังคม



# เรื่อวน่ารู้.....

- สุนัขตัวผู้เป็นโรคพิษสุนัขขี้มากกว่าตัวเมีย
- สุนัขแสดงอาการบ้าแบบดุร้ายมากกว่าแบบซึม
- กว่า 90 % ของผู้ที่ตายด้วยโรคพิษขี้จากการไม่ไปพบแพทย์เพื่อรับกัสัตว์กัด
- ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขขี้ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการถูกกัด หรือสุนัขที่เจ้าของแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขขี้
- สุนัขอายุน้อยเป็นโรคพิษสุนัขขี้มากกว่าอายุมาก
- ผู้ชายตายด้วยโรคพิษสุนัขขี้มากกว่าผู้หญิง
- การช่วยเหลือสุนัขจรจัดโดยการหาอาหารแต่ไม่นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขขี้และคุมกำเนิดไม่ให้มีลูก เป็นการเพิ่มจำนวนและแพร่กระจายโรคพิษสุนัขขี้
- ลูกสุนัข (ทุกอายุ) มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขขี้ได้เช่นเดียวกับสุนัขโต



# โรคพิษสุนัขขี้

เราเลี้ยง นั้มีสุขภาพของประชนให้เติบโตสมังจักร์



จัดทำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

โทร. ๐๓๒- ๕๖๕๑๑๐

แจ้งสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาขากันสุนัขที่ที่มองเห็นสุนัขหรือสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขขี้