

แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า

เขียนโดย กนกวรรณ แก้ววงศ์

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:30 น.

โรคพิษสุนัขบ้า

เกิดจากเชื้อ: รูปร่างคล้ายกระสุนปืน ถูกทำลายได้ง่าย เมื่อถูกความร้อน ความแห้ง แสงแดด ยาฆ่าเชื้อ



ดอลรีน แอลกอฮอล์ กรด หรือ ต่ำอย่างแรง เกิดในสัตว์เลือดอุ่น เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว เ ลิง ชะนี กระรอก กระแต เสือ หมี หนู ค้างคาว รวมทั้งคน แต่ในประเทศไทยพบมา (96% ของจำนวนที่พบเชื้อ ห้องปฏิบัติการ) รองลงมา คือ แมว

การติดต่อ โดยถูกสัตว์ที่เป็นโรค กัด ข่วน เล้ น้าลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือ บาดแผล

ระยะฟักตัวในสุนัข 7 วัน ถึง 6 เดือน ขึ้น ั บริเวณที่ได้รับเชื้อ ความรุนแรงของเชื้อ ประมาณ 2-6 สัปดาห์

อาการในสุนัข มี 2 ชนิด คือ ชนิดซึม และ ชนิดดุ ร้าย



จะทำอย่างไรเมื่อถูกสัตว์กัด



1. ล้างแผล

ล้างแผลด้วยสบู่ หลาย ๆ ครั้ง เพื่อล้างเชื้อ ออกจากบาดแผลถ้ามีเลือด

ออกควรปล่อยให้เลือดไหลออก อย่าบีบหรือเดิน แผล เพราะจะทำให้เชื้อแพร่กระจายไป



2. ใส่ยา

ใส่ยาใส่แผล เช่น เบตา ดิน ทิงเจอร์ไอโอดีน แอลกอฮอล์ 70 %

จะช่วยฆ่าเชื้อ อย่าใส่สิ่งอื่น เช่น เกลือ ยาฉุน ลง ในแผล ไม่ควรเย็บแผล ถ้าจำเป็นควรรอไว้ 3-4 วัน ถ้าเลือดออกมากหรือแผลใหญ่อาจเย็บหลวม ๆ และใส่ท่อระบายไว้



3. กักหมา

กักสัตว์ที่กัดไว้ด้ อย่างน้อย 15 วัน โดยให้น้ำ และอาหารตามปกติ

อย่าฆ่าสัตว์ให้ตายทันที เว้นแต่สัตว์เ ูรร้ายกัดคนหรือ สัตว์อื่นหรือไม่สามารถกักสัตว์: ถ้าสัตว์หนีหายไป ให้ถือว่าสัตว์นั้นเป็นโรคพิษสุ



4. หาทหมอ

รับไปหาแพทย์หรือสัตวแพทย์ กับที่รี เพื่อขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน อย่ารอจนสัตว์

ที่กัด เมื่อสัตว์ตายรีบตัดหัวส่ง สุนัขบ้า

จะส่งซากสัตว์ที่ตายไปโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อสงสัยว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ควรกัก ปลอดกัย และเฝ้าดูอาการประมาณ 15 วัน ทำลายสัตว์โดยไม่จำเป็น ควรปล่อยให้สัตว์ ธรรมชาติตายเอง แต่ ในการส่งช ะสักไว้เสมอว่า สัตว์อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า สวมถุงมือขณะเก็บซาก และล้างมือให้สะอาด ซาก ควรส่งเฉพาะส่วนหัว



1. ตัดหัวสัตว์

ตัดหัวสัตว์ตรงคอต่อ ใส่ถุงพลาสติกหลาย ๆ ชั้น รัดปากถุงให้แน่น ทุกครั้งที่ตัด ถ้าเป็น สัตว์เล็กสามารถส่งได้



2. แช่แข็ง

ใส่กระติกหรือภาชนะ กล่องโฟม แล้วใส่น้ำแข็งให้ล ะดลottedเวลา แล้วใส่น้ำแข็งให้ล ะดลottedเวลา



3. ประวัต

ส่งพร้อมประวัติสัตว์ ชนิด แ อการป่วย ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข เจ้าของสัตว์ และผู้ถูกกัด

ในกรณีส่งซากควรส่ง ภายใ ชั่วโม หรือติดต่อบ้านักงานปศุสัตว์เขต จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ

ควรไปพบสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนเมื่อมีอาการสงสัยเกี่ยวกับสัตว์ เช่น ชนิดสัตว์ สี เฝ นันท์ อายุ สถานที่ถูกกัด เบื่ออาหาร ท้องอืดและ

จะป้องกันสุนัขบ้าได้อย่างไร



1. ไม่ปล่อยสุนัขพ่นพ่าย

สุนัขจรจัดที่อยู่ข้างถนนเป็นสัตว์แพร่ เชื้อโรคที่สำคัญ อาจกัด ผ่านไปมาหรือกัดสุนัขอื่นที่

โรคพิษสุนัขบ้าได้



2. ฉีดวัคซีนป้องกันทุกปีสุนัข

จระเป็นหน้าที่ของเจ้า (ตามพระราชบัญญัติโรคพิษ สุนัขบ้า 2535) ที่จะต่อ

สุนัขอายุระหว่าง 2-4 เดือน ได้ไปรับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดซ้ำตามที่ส



3. อย่าให้มีลูกมากโดยการทำ

หมันสุนัขทั้งตัวผู้และตัว หรือฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขตัว เมีย ไม่ให้มีลูกมากเกินไปจน ไม่อาจเลี้ยงดูได้ต้องนำไป

กลายเป็นสุนัขจรจัดและเป็นปัญหาของสังคม

เรื่องน่ารู้....



สุนัขตัวผู้เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าตัวเมีย



สุนัขแสดงอาการบ้าแบบดุร้ายมากกว่าแบบซึม



กว่า 90 % ของผู้ที่ตายด้วยโรคพิษ: จากการไม่ไปพบแพทย์เพื่อรับก สัตว์กัด



ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่ เนื่องมาจากการถูกร ัด หรือสุนัขที่ เจ้าของแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า



สุนัขอายุน้อยเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าอายุ มาก



ผู้ชายตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าผู้หญิง



การช่วยเหลือสุนัขจรจัดโดยการหาอาหาร แต่ไม่นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ คุมกำเนิดไม่มีลูก เป็นการเพิ่มจำนวน



โรคพิษสุนัขบ้า

เรารู้สิ่ง น้มีไขสูงเพ วมประตณในตำบล



